



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS -SARS-CoV-2 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

<p>PROCEDIMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none">• procedimentos odontológicos devem se restringir às emergências (que representam risco de morte e estão restritos à assistência em ambiente hospitalar) e às urgências.
<p>TRIAGEM</p> <ul style="list-style-type: none">• Realização de triagem prévia de pacientes com síndrome gripal (febre, tosse, dor de garganta, dores musculares).• Programar agendamentos espaçados o suficiente para minimizar o possível contato com outros pacientes na sala de espera, além de permitir a execução cuidadosa dos procedimentos preconizados para a prevenção e controle das infecções em consultórios odontológicos.• Orientar que os pacientes não tragam acompanhantes para a consulta, exceto nos casos em que houver necessidade de assistência, devendo nestes casos ser recomendado apenas um acompanhante. Este acompanhante deve permanecer com máscara cirúrgica.
<p>INFRA ESTRUTURA</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispor cadeiras na sala de espera com pelo menos 1 metro de distância entre si e, quando aplicável (em grandes espaços), colocar avisos sobre o distanciamento nas cadeiras, de forma intervalada.• Remover da sala de espera revistas, outros materiais de leitura, brinquedos e outros objetos que possam ser tocados por outras pessoas e que não possam ser facilmente desinfetados.
<p>SAÚDE DO TRABALHADOR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificação imediata de casos suspeitos e o afastamento do ambiente de trabalho de forma a diminuir a transmissão pessoa a pessoa.• Atendimento agendado .
<p>HIGIENE PESSOAL DOS COLABORADORES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reforçar as medidas de higiene pessoal, garantindo que todos os colaboradores procedam a lavagem cuidadosa e frequente de mãos, principalmente, antes e depois do contato com os pacientes, após tocar em bancadas, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que necessário, com água e sabonete líquido (sabonete líquido antisséptico), secar as mãos com papel toalha de material não reciclável e lixeira com pedal para descarte. Na ausência, usar o álcool em gel a 70%.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- **Treinamento** de toda equipe, quanto a correta lavagem de mãos e demais hábitos de higiene. O álcool em gel pode ser usado de forma complementar, não sendo uma exigência.
- Uso de EPI'S- gorro descartável, Óculos de proteção, protetor facial(Face shid), Máscara N95/PFF2 ou equivalente, capote impermeável ou equivalente, e Luvas;
- Uniformes limpos a cada turno de trabalho, devendo ser frequentemente lavados;
- Retirada de adornos pessoais (anéis, brincos, pulseiras e relógios)
- Higienização dos óculos.
- Para os EPI's como luvas, máscaras e óculos, os mesmos devem ser treinados para o seu uso correto, de forma que não se tornem possíveis focos de contaminação;
- Não utilizar adereços como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios em horário de trabalho;

HIGIENE DO AMBIENTE:

- HIGIENE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS: aumentar a frequência da limpeza e desinfecção rigorosa das instalações, móveis, equipamentos, bancadas, balcões dos caixas, maçanetas, banheiros, utensílios e demais superfícies com água, sabão e desinfetar com solução clorada (**hipoclorito de sódio a 1%**), **álcool a 70%** líquido ou gel ou outro **desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde** (seguir as orientações do fabricante), visando controlar quaisquer riscos que possam estar associados aos trabalhadores doentes.
- Rever seus procedimentos operacionais padrão, POP
- Manter atualizada a manutenção e limpeza dos equipamentos de climatização.
- Garantir aos colaboradores de serviços gerais os EPI's necessários para a coleta do lixo e os procedimentos de higienização.

PROCEDIMENTOS GERAIS

- Assegurar a qualidade e renovação do ar, utilizar ar condicionado com exaustão que garanta as trocas de ar necessárias ou a manutenção das janelas abertas durante o atendimento;
- Deixar bancadas e mesas auxiliares livres de materiais para possibilitar limpeza adequada;
- Realizar a desinfecção de superfícies por meio de fricção com solução de álcool 70%, quaternário de amônia ou substância com capacidade desinfetante superior;
- Utilizar barreiras de proteção em superfícies críticas e trocá-las após cada atendimento;
- Utilizar peróxido de hidrogênio de 1,0% a 1,5% (9mL da solução por 30



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

segundos), como enxaguatório bucal pré procedimento;

- Evitar, ao máximo o uso de seringa tríplice, principalmente em sua forma em névoa (spray), acionando os dois botões simultaneamente; regular a saída de água de refrigeração;
- Sempre que possível recomenda-se utilizar dispositivos manuais, como escavadores de dentina, para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta e baixa rotação) e curetas periodontais para raspagem periodontal;
- Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e ultrassom;
- Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, inclusive canetas de alta e baixa rotação;
- As luvas e capote ou avental devem ser removidos e descartados como resíduos infectantes após a realização de cada atendimento;
- Considerando que, uma das principais vias de contaminação do profissional de saúde é no momento de desparamentação, é fundamental que todos os passos de higiene de mãos entre a retirada de cada EPI sejam rigorosamente seguidos;
- Quando for extremamente necessário utilizar técnicas radiografias intrabucais, proceder de forma cuidadosa, para evitar o estímulo da salivação e tosse;
- Deve ser realizada a aspiração contínua da saliva residual e se possível com sistema de sucção de alta potência (bomba a vácuo). A limpeza das mangueiras que compõem o sistema de sucção e da cuspeira deve ser realizada ao término de cada atendimento, com desinfetante a base de cloro na concentração de 2500mg de cloro por Litro de água (hipoclorito de sódio a 2,5%). É importante ter cuidado adicional com os sistemas de sucção e cuspeiras que podem apresentar refluxo.

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CIEVS JABOATÃO

Email: cievs.jaboatão@gmail.com- FONE: 81-99975.1640(24H)

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: (81) 99975.3952



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA